

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2022/2023

Do nascimento à terceira idade





VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE															ADOLESCENTE			ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS						
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS	NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*		
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO						
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente															SIM	SIM	SIM			
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.							CONTRAINDICADA															SIM	SIM	NÃO			
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)					SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa							
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM							
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM							
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	VPC10 ou VPC13 – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13							
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO		Reforço aos 11 e 16 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos	SIM	SIM, menC e menACWY							
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO						
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO															SIM	NÃO	NÃO										
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL															SIM, menores de 5 anos e maiores de 60 anos			SIM	SIM								
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias: dose única. Como não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina, de acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose em outras idades pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal															SIM	SIM	NÃO										
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, até 59 anos	SIM	NÃO							
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM	SIM	SIM							
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM							
HPV											Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.			Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)			SIM, duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM	SIM, três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais							
Pneumocócica 23 valente											Vacinar pessoas em situações especiais de risco					Duas doses com intervalo de cinco anos			NÃO	SIM	SIM							
Herpes zóster											A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco					Rotina a partir dos 50 anos			NÃO	SIM	NÃO							
Dengue	CONTRAINDICADA															Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 6 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses			CONTRAINDICADA			NÃO	SIM	NÃO				
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19																											


12/01/2023 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf (acesso em 01.09.2022)

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm

Mapa: RM - 2011/12